

CONSULTATION
EN UROLOGIE

Établissement :

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso avant de remplir ce formulaire.

Raison de consultation		Échelle de priorité clinique : A : ≤ 3 jrs B : ≤ 10 jrs C : ≤ 28 jrs D : ≤ 3 mois E : ≤ 12 mois					
Lithiase	<input type="checkbox"/> Calcul urétéral (Prérequis : A/C urine, créatinine, RX abdominal, FDM-C—demandé)	C	Suspicion de malignité	<input type="checkbox"/> Masse testiculaire suspecte de néoplasie (Prérequis : écho testiculaire demandée)	B		
	<input type="checkbox"/> Calcul rénal ou vésical asymptomatique (Prérequis : A/C urine, créatinine, RX-abdominal, FDM-C—demandé)	D		<input type="checkbox"/> Examen prostatique suspect (TR) (Prérequis : APS)	C		
Infection	<input type="checkbox"/> Infection urinaire chez l'homme (Prérequis : écho rénale et pelvienne demandée, A/C urine)	D		<input type="checkbox"/> APS élevé recontrôlé après 6 sem. (Prérequis : APS × 2, A/C urine négative)	C		
	<input type="checkbox"/> Infections urinaires basses récidivantes chez la femme (+ de 4 par année) (Prérequis : A/C urine)	E		<input type="checkbox"/> Masse vésicale (Prérequis : rapport d'imagerie, A/C urine)	C		
Dysfonction sexuelle	<input type="checkbox"/> Dysfonction érectile avec échec au traitement médical (Prérequis : testostérone, glycémie, lipides, HbA1c)	E		<input type="checkbox"/> Masse rénale solide ou kyste rénal complexe (Prérequis : créat, FDM-abdo-pelvien-C—C+ demandé, A/C urine, cytologie X3)	C		
	<input type="checkbox"/> Maladie de la Peyronie	E		Autres	<input type="checkbox"/> Masse scrotale non suspecte de malignité (procède, varicocèle, spermatocele) (Prérequis : écho testiculaire demandée)	E	
	<input type="checkbox"/> Hémospémie récidivante avec examen prostatique non suspect de malignité (Prérequis : A/C urine, APS si > 40 ans)	E			<input type="checkbox"/> Hydronéphrose obstructive ou symptomatique (Prérequis : écho abdominale pelvienne demandée, RX abdominal, créat, A/C urine)	C	
Hématurie	<input type="checkbox"/> Hématurie macroscopique intermittente avec culture négative (Prérequis : A/C urine, FDM-abdominal pelvien-3-phases demandé et cytologie demandée)	C		<input type="checkbox"/> Symptômes du bas appareil urinaire incommodants (HBP avec échec de traitement, incontinence, vessie hyperactive) (Prérequis : APS, A/C urine)	E		
	<input type="checkbox"/> Hématurie microscopique (Prérequis : A/C urine, écho abdominale pelvienne demandée, cytologie)	D		<input type="checkbox"/> Syndrome de douleur pelvienne chronique (incluant prostatite chronique ou cystalgie) (Prérequis : cytologie, gonorrhée et chlamydia négatifs, A/C urine)	E		
Autre (utiliser cette section pour modifier une priorité ou pour toute autre raison de consultation et justifier) :					Priorité clinique		
Renseignements cliniques pertinents (joindre rapports, médication, etc.)							
Besoins spéciaux :							
Identification du médecin référent et du point de service				Estampe			
Nom du médecin référent		Nom du point de service					
Ind. rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. rég.			N° de télécopieur	N° de permis
Signature						Date (année, mois, jour)	
Médecin de famille : <input type="checkbox"/> Idem au médecin référent <input type="checkbox"/> Usager sans médecin de famille				Référence nominative (si requis)			
Nom du médecin de famille				Si vous désirez une référence à un médecin ou à un point de service en particulier			
Nom du point de service							

Complétion du formulaire 	
Ce formulaire doit être utilisé pour la clientèle de 16 ans et plus.	
Identification de l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> Inscrire le numéro de téléphone qui permettra au Centre de répartition des demandes de service (CRDS) de confirmer le rendez-vous (RV). Inscrire le code postal afin de permettre de donner un RV à proximité du domicile de l'utilisateur.
Raison de consultation	<ul style="list-style-type: none"> Cocher la raison de consultation. Sinon inscrire la raison de consultation non prévue au formulaire dans la case « Autre » et préciser la priorité clinique.
Priorité clinique	<ul style="list-style-type: none"> Justifier toute priorité clinique modifiée ou toute autre raison de consultation. <p><i>Permet au CRDS de connaître le délai maximal pour réaliser la consultation. Délai calculé en jours calendrier (inclus jours fériés et fins de semaine). Vous serez informé de toute priorité ne pouvant être respectée.</i></p>
Renseignements cliniques pertinents	<ul style="list-style-type: none"> Inscrire toutes les informations justifiant la priorité clinique ou sa modification. Acheminer au CRDS tous les prérequis (rapports ou analyses) nécessaires pour la consultation. Joindre la liste de médicaments. Besoins spéciaux : Inscrire les besoins particuliers tels que : interprète, déplacement en fauteuil roulant ou autre.
Identification du médecin référent et du point de service	Remplir cette section afin que le rapport de consultation vous soit acheminé au bon point de service.
Référence nominative	Il est possible que le délai ne soit pas respecté si le médecin demandé n'est pas disponible. Le CRDS communiquera alors avec vous afin de convenir d'une solution alternative.
Formulaire	<ul style="list-style-type: none"> Acheminer par télécopieur le formulaire à votre CRDS. Ne pas remettre de copie du formulaire à l'utilisateur.
Alertes cliniques (liste non exhaustive)	
Diriger l'utilisateur à l'urgence	
<ul style="list-style-type: none"> Hématurie macroscopique active (non infectieuse) Colique néphrétique non soulagée par la médication Utiliser le formulaire de l'Accueil clinique si disponible Hyperthermie d'origine urinaire Suspicion de torsion testiculaire Fracture du pénis ou priapisme 	