

CONSULTATION EN ORTHOPÉDIE
ADULTE

Établissement :							
Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.							
Raison de consultation		Échelle de priorité clinique : A : ≤ 3 jrs B : ≤ 10 jrs C : ≤ 28 jrs D : ≤ 3 mois E : ≤ 12 mois					
*Traitement = 3 mois de physiothérapie et 2 infiltrations réalisées.							
Épaule	<input type="checkbox"/> Rupture complète de la coiffe des rotateurs aiguë prouvée à l'IRM ou à l'écho (usager < 50 ans) <i>(Prérequis : rapport IRM ou écho)</i>	C	Pied/ Cheville	<input type="checkbox"/> Rupture complète du tendon d'Achille	B		
	<input type="checkbox"/> Maladie de la coiffe des rotateurs (bursite, tendinite, accrochage, déchirure chronique coiffe des rotateurs, tendinose) <i>(Prérequis : échec au traitement* et rapport IRM ou écho)</i>	D		<input type="checkbox"/> Entorse sévère persistante cheville (symptômes plus de 2 mois malgré immobilisation et physio) <i>(Prérequis : rapport RX ou IRM)</i>	C		
	<input type="checkbox"/> Luxation récidivante épaule avec physiothérapie débutée <i>(Prérequis : rapport RX, arthro-IRM)</i>	D		<input type="checkbox"/> Arthrose invalidante cheville <i>(Prérequis : échec au traitement* et rapport RX)</i>	D		
	<input type="checkbox"/> Arthrose invalidante épaule <i>(Prérequis : échec au traitement* et rapport RX)</i>	D		<input type="checkbox"/> Hallux valgus ou orteils marteau symptomatiques <i>(Prérequis : rapport RX)</i>	E		
Coude	<input type="checkbox"/> Rupture complète du tendon biceps distal	B	Autres	<input type="checkbox"/> Fracture aiguë mineure non déplacée immobilisée ¹ ou subluxation aiguë <i>(Prérequis : RX)</i>	B		
	<input type="checkbox"/> Épicondylite et épitrochléite <i>(Prérequis : traitement* et rapport écho ou IRM)</i>	D		<input type="checkbox"/> Néoplasie musculo-squelettique <i>(Prérequis : rapport RX)</i>	B		
Genou	Rupture complète du tendon : <input type="checkbox"/> Rotulien <input type="checkbox"/> Quadriceps	B		<input type="checkbox"/> Entorse sévère persistante poignet (symptômes plus de 2 mois malgré attelle et physio) <i>(Prérequis : rapport RX et IRM)</i>	C		
	<input type="checkbox"/> Rupture ligament croisé avec physiothérapie initiée <i>(Prérequis : rapport IRM)</i>	C		<input type="checkbox"/> Arthrose invalidante hanche <i>(Prérequis : échec au traitement* et rapport RX)</i>	D		
	<input type="checkbox"/> Déchirure méniscale aiguë ou traumatique (usager < 60 ans) <i>(Prérequis : rapport IRM)</i>	D		<input type="checkbox"/> Syndrome du tunnel carpien ou tunnel cubital confirmé à EMG <i>(Prérequis : rapport EMG)</i>	C		
	<input type="checkbox"/> Arthrose invalidante du genou <i>(Prérequis : échec au traitement* et rapport RX)</i>	D					
Autre raison de consultation non standardisée au formulaire ou modification d'une priorité clinique (justification OBLIGATOIRE dans la section suivante) :					Priorité clinique		
Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires				Si prérequis exigé(s) :			
				<input type="checkbox"/> Disponible(s) dans DSQ			
				<input type="checkbox"/> Annexé(s) à la présente demande			
				<input type="checkbox"/> Échec au traitement*			
Besoins spéciaux :							
Identification du médecin référent et du point de service				Estampe			
Nom du médecin référent			N° de permis				
Ind. rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. rég.			N° de télécopieur	
Nom du point de service							
Signature						Date (année, mois, jour)	
Médecin de famille : <input type="checkbox"/> Idem au médecin référent <input type="checkbox"/> Usager sans médecin de famille				Référence nominative (si requis)			
Nom du médecin de famille				Si vous désirez une référence à un médecin ou à un point de service en particulier			
Nom du point de service							

Nom :

Site :
Dossier:

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Diriger l'utilisateur à l'urgence

- Fracture ouverte avec ou sans compromis neurovasculaire
- Luxation non réduite
- Syndrome compartimental
- Arthrite septique
- Syndrome de la queue de cheval

(1) Immobilisation de fracture(s) :

Pour des fractures non immobilisées, vous êtes encouragé à ne pas diriger les usagers à l'urgence, mais d'utiliser plutôt les corridors de services disponibles dans votre région.